

# BON USAGE DU DABIGATRAN : ANALYSE RETROSPECTIVE




J. Husser <sup>(1)</sup>, M. Bonnin <sup>(1)</sup>, S. Mosnier-Thoumas <sup>(1)</sup>, D. Breilh<sup>(1)(2)</sup>

(1) Pharmacie Groupe Hospitalier Sud, Hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac.

(2) Laboratoire de Pharmacocinétique et de Pharmacie Clinique, Groupe PK/PD  
INSERM U1034, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux.

## CONTEXTE

- Risques hémorragiques des nouveaux anticoagulants oraux.
- Facteurs de risque individuels.
- Absence de surveillance biologique.
- Absence d'antidote spécifique.



Une évaluation des facteurs de risque ainsi qu'à un respect des précautions d'emploi (PE) et des recommandations.

## PATIENTS ET METHODE

Etude rétrospective des dossiers de patients hospitalisés au cours du second semestre 2012 et ayant une prescription de dabigatran.  
Absence de secteur orthopédique.

## RESULTATS

108 patients d'âge moyen 70,88 ans, présentant tous une fibrillation auriculaire.  
86.1% d'entre eux étaient hospitalisés en cardiologie.

Patients admis avec un traitement comprenant du dabigatran : 57.4%.

Patients sortis avec une prescription de dabigatran : 96.3%.

Posologies de sortie :

- 1 prescription à 75mg-0-75 mg justifiée par une clairance de la créatinine à 39 ml/min hors recommandations de l'Afssaps.
- 56 prescriptions à 110mg-0-110 mg
- 47 prescriptions à 150mg-0-150 mg.

Etat clinique des patients :

29.4% des patients étaient âgés de plus de 75 ans.  
Pas d'insuffisance hépatique, pas de poids inférieur à 50kg, pas de comorbidités associées à un risque hémorragique majeur.

Présence d'un porteur de prothèse valvulaire cardiaque.

Un seul patient était en insuffisance rénale sévère (clairance proche de 30 ml/min) sans posologie adaptée.

Interactions :

- 3 associations déconseillées avec la rifampicine
- 58 PE avec l'amiodarone et 2 PE avec le vérapamil.

## CONCLUSION

- ✓ Respect correct des recommandations des autorités de santé en cours d'hospitalisation.
- ✓ Actualité : contre-indication, depuis janvier 2013, du dabigatran chez le patient porteur de prothèse valvulaire cardiaque.
- ✓ Place importante du pharmacien dans la promotion du bon usage et dans la veille des recommandations de l'ANSM.

Référence : Point d'information de l'Afssaps en date du 26 avril 2012.