

E Duparc (1); E Morice (1); D Laure (1); A Tirizica (2); M Bousta (3); R Delplanque (1)
(1) Pharmacie, Groupe Hospitalier du Havre; (2) Urgences, Groupe Hospitalier du Havre ;
(3) Réanimation, Groupe Hospitalier du Havre.

CONTEXTE

Les AVK (anti-vitamines K) sont associés à un risque hémorragique élevé : 4000 décès par an. Ils sont la première cause d'hospitalisation pour effets indésirables graves : 17000 hospitalisations par an. Leur consommation est en constante augmentation. A l'initiative de la pharmacie, un groupe de travail a été mis en place au GHH pour améliorer le bon usage du PPSB (antidote des AVK) à partir des recommandations HAS 2008*.

OBJECTIFS


Evaluer l'impact des recommandations sur le Bon Usage du PPSB dans les services de soins du GHH.

MATERIEL ET METHODE




RESULTATS

Indications des prescriptions de PPSB



Prescription « Hors AMM » 3% en 2012
(vs 26% en 2010)

Posologie du PPSB conforme à l'indication



Posologies conformes à l'AMM : 76 % en 2012
(vs 59% en 2010)

INR mesuré avant administration : 77% (2010) → 86% en 2012

INR de contrôle (après injection) : 46% (2010) → 66% en 2012

CONCLUSION

Une nette amélioration de l'utilisation du PPSB est à noter sur 2 ans. En effet le nombre de prescriptions hors AMM a été divisé par 8 entre les deux évaluations réalisées. Ceci montre bien l'importance du rôle des pharmaciens dans l'amélioration du bon usage des médicaments.