

# CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE : DÉMARCHE INNOVANTE DANS UN CENTRE HOSPITALIER



Choukroun C, Peus E, Barcelo C, Hebert V, Duplissy E  
Service de Pharmacie, Centre Hospitalier de Perpignan



N°48

## Contexte

La conciliation médicamenteuse permet de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse en optimisant le recueil des antécédents pharmaceutiques.

## Objectif

Evaluer l'impact de la conciliation sur la continuité des traitements de l'entrée jusqu'à la sortie des patients.

## Matériels et méthodes


- 33 patients conciliés: 22 à l'entrée, 11 à la sortie
- 4 unités de soins : gastro-entérologie, médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique
- Conciliation rétroactive
- Sources : patient, médecin traitant, officine (au moins 2 sur 3)
- Réalisation du bilan médical optimisé BMO
- Création d'une fiche de conciliation

## Résultats

### Entrée


82% des patients ont au moins 1 divergence non intentionnelle (DNI)

Divergences → 38 % intentionnelles  
→ 62 % non intentionnelles



### Sortie

73% des patients ont au moins 1 DNI



## Conclusion

Le nombre élevé et la gravité des divergences détectées soulignent le rôle essentiel du pharmacien clinicien aux côtés de l'équipe soignante. Aussi, une conciliation proactive est-elle envisagée dans le futur, ainsi qu'une consultation pharmaceutique avec remise d'un document d'éducation-santé aux patients.

(1) Vira T, Colquhoun M, Etechells E. Reconcilable differences: correcting medication errors at hospital admission and discharge. QualSaf Health Care. 2006;15

(2) Trivalle C, Cartier T, Verny C, et al. Identifying and preventing adverse drug events in elderly hospitalised patients: a randomised trial of a program to reduce adverse drug effects. J Nutr Health Aging 2010;14:57-61.