

Legeay C. (1); Berthe A. (1); Rouiller I. (1); Maulaz B. (1);
(1) Pharmacie, CHU Nantes, Nantes.

CONTEXTE/OBJECTIF

Décision du Comedims de réaliser une étude rétrospective dès le référencement de la palipéridone, antipsychotique atypique à durée d'action prolongée, administré une fois par mois. L'objectif est d'évaluer le bon usage de ce traitement coûteux, de prescription particulière et d'utilisation récente.

PATIENTS ET METHODES

Evaluation rétrospective, sur 8 mois
A partir des prescriptions nominatives informatisées et des dossiers médicaux (logiciel Clinicom soin/ Intersystème)



Recueil de données :

- épidémiologie
- stabilisation préalable par rispéridone
- respect de la posologie + schéma d'administration
- respect de l'arrêt du traitement oral en cas de relais de cette voie

RESULTATS

- 84 patients recrutés
- 232 injections effectuées

- Age moyen : 40 ans [19;81]
- Ratio Homme/Femme : 3,4



Conformité complète pour les 3 critères : 67,8%

CONCLUSION

Malgré une prescription nominative avec validation pharmaceutique informatisée, on constate la persistance d'un trop grand nombre de non-conformités avec les lignes directrices. Les recommandations posologiques en psychiatrie se heurtent notamment à des tableaux cliniques justifiant l'emploi de doses plus ou moins élevées par rapport aux recommandations. Pour la palipéridone intra-musculaire, il a été constaté des pertes d'effets en fin de mois, justifiant des doses administrées plus élevées. Devant ce constat, une réévaluation de ce traitement de prescription difficile générant encore trop de non-conformités, et de coût important face aux alternatives existantes, apparaît nécessaire. Néanmoins les médecins et les patients sont satisfaits de l'injection unique mensuelle de palipéridone au lieu de celle bimensuelle de rispéridone retard injectable.