

RECOMMANDATIONS ANSM VIS-A-VIS DE L'HYDROXYZINE : QUELS SUIVI ET APPLICATION DANS UN CHU ?

Introduction

Hydroxyzine
Anxiolytique utilisé couramment à l'hôpital

Réévaluation du rapport bénéfice/risque par l'ANSM
Avril 2015 - Nouvelles restrictions d'utilisation pour minimiser le risque d'allongement [QT]

Dose maximale recommandée :
100 mg/jour chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 40 kg,
non recommandée chez les sujets âgés avec un maximum de 50mg/jour en cas de nécessité

Application des recommandations au CHU de Nice ?

Matériel et méthodes




❖ Enquête rétrospective sur 2 périodes de 4 mois : relevé des prescriptions IV et PO d'hydroxyzine avant et après recommandations ANSM (30/04/2015)

Extraction des données

- Age du patient
- Posologie d'hydroxyzine
- Service d'hospitalisation

Dépassement de posologie si :	
< 65 ans ET > 100mg/j	≥ 65 ans Et > 50mg/j

Résultats et discussion



Malgré une baisse des posologies d'hydroxyzine depuis les recommandations de l'ANSM, cette différence est non significative chez l'adulte et chez le sujet âgé.

En étudiant les sous populations de patients en fonction de leur service d'hospitalisation, une différence significative est trouvée chez les patients hospitalisés en **chirurgie** ($p < 0.01$) entre les périodes avant et après recommandations de l'ANSM.

➔ Lien avec l'actualisation des protocoles informatisés utilisés dans les services de chirurgie pour la prémédication avant l'anesthésie

Conclusion

- **Tendance à la baisse mais insuffisante**
- **Intervention pharmaceutique systématique et appel des médecins en cas de dépassement de posologie**
- **Rappel sur le respect des nouvelles recommandations de l'ANSM en COMEDIMS**